

የመተንፈሻ አካላት ሻይረስ(አርኤስቪ)

ውድ ወላጅ እና አሳዳጊ፣

ይህ የእውነታ ወረቀት የቀረበልዎት ምክንያት፡

- እርስዎ ወይም ልጅዎ ለየመተንፈሻ አካላት ሻይረስ(አርኤስቪ) ተጋልጠው ሊሆኑ ስለሚችሉ ነው።
- ለመረጃ አገልግሎት ብቻ።

ስለ የመተንፈሻ አካላት ሻይረስ(አርኤስቪ) አጠቃላይ መረጃ

የመተንፈሻ አካላት ሻይረስ(አርኤስቪ) ምንድን ነው?

- በትናንሽ ህጻናት ላይ ብዙውን ጊዜ መለስተኛ እና ጉንፋን መሰል ምልክቶችን የሚያመጣ የመተንፈሻ አካላት ሻይረስ ነው።
- በተለይ ለጨቅላ ህጻናት እና ለአዋቂዎች ከባድ ሊሆን ይችላል።
- የተለመደ እና ሁሉም ልጆች እስከ 2 ዓመታቸው ይያዛሉ።
- በክረምት ወይም በጸደይ መጀመሪያ ወቅት የተለመደ ነው።
- ከ1 አመት በታች ለሆኑ ህጻናት እንደ ብሮንካይቲስ እና የሳምባ ምች የመሳሰሉ ዝቅተኛ የመተንፈሻ አካላት (ሳንባዎች) ኢንፌክሽኖች ተደጋጋሚ መንስኤ ነው።

ማን ሊይዘው ይችላል?

- ማንኛውም ግለሰብ ቀደም ብሎ በጉንፋን ቢያዝም እንኳን እንደገና በጉንፋን ሊያዝ ይችላል።
- አንዳንድ የህብረሰብ ክፍሎች በጣም ሊታመሙ ወይም ለከፍተኛ የህክምና ችግሮች ሊጋለጡ ይችላሉ፣ ቡድኖቹ እነዚህም በታች ያሉትን ያጠቃልላል፡
 - ጨቅላ ህጻናት እና ትንንሽ ልጆች
 - ከ50 ዓመት በላይ የሆኑ ግለሰቦች
 - እርጉዝ ሴቶች
 - የተዳከመ በሽታን የመከላከል አቅም ያላቸው ወይንም ሥር የሰደደ የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች
- በበሽታው ምክንያት ለከፍተኛ አደጋ ተጋላጭ የሆኑ ግለሰቦች (ከላይ ያለውን ይመልከቱ) ለ አርኤስቪ ተጋልጫለሁ ብለው ካሰቡ የጤና እንክብካቤ አቅራቢቸውን ማነጋገር አለባቸው።

ምልክቶቹ ምንድን ናቸው?

- ትኩሳት (የአሜሪካ የሕፃናት ሕክምና አካዳሚ ትኩሳትን 100.4°F [38°C] ወይም ከዚያ በላይ የሙቀት መጠን አድርጎ ይገልጻል።)
- የአፍንጫ ፍሳሽ
- ማስነጠስ
- ማሳል
- የምግብ ፍላጎት ማጣት
- በተለይ በትናንሽ ጨቅላ ህጻናት (ከ 6 ወር በታች) እና አርኤስቪ ያለባቸው ጨቅላ ህጻናት ላይ ተጨማሪ ምልክቶች መታየት አለባቸው።
 - ዝቅተኛ የእንቅስቃሴ ደረጃ
 - መነጨነጭ

- የምግብ ፍላጎት ማጣት
- በፍጥነት መተንፈስ ወይም የመተንፈስ ችግር (የሚንቀጠቀጡ የአፍንጫ ቀዳዳዎች፣ ማጉረምረም፣ ጩኸት ጩምሮ)
- አብዛኛዎቹ ምልክቶች ከ8 እስከ 15 ቀናት ውስጥ ይጠፋሉ።

እንዴት ነው የሚሰራው?

- ሻይረሱ በሰላ፣ በማስነጠስ፣ በለሐጭ እና ከአፍንጫ በሚወጡ ፈሳሾች ውስጥ ይገኛል።
- አርኤስቪ የያዘው ሰው ሲያስል ወይም ሲያስነጥስ አጠገብ ያለው ሰው የወጡትን ጠብታዎች ከተነፈሰ ሻይረሱ ሊሰራጭ ይችላል።
- እንዲሁም ከዚህ በታች ባሉት ሁኔታዎች ሊሰራጭ ይችላል፡
 - አርኤስቪ ሻይረስ ያለበትን ነገር ከነኩ በኋላ አይንን፣ አፍንጫን ወይንም አፍን በመንካት።
 - አርኤስቪ ከያዘው ግለሰብ ጋር የምንጠቀምባቸውን ዕቃዎች ወይም ኩባያዎች መጋራት።
- አርኤስቪ ለብዙ ሰዓታት በነገሮች ላይ ሊኖር ይችላል።
- አንድ ሰው ምልክቱ መታየት ካቆመ በኋላም ቢሆን ለሳምንታት የአርኤስቪን ሻይረስ ሊያሰራጭ ይችላል።

ልጅ የመተንፈሻ አካላት ሲንስሻል ሻይረስ (RSV) እንዳለበት እንዴት አውቃለሁ?

- የጤና እንክብካቤ አቅራቢ ሻይረሱን ለማግኘት ከአፍንጫ ወይም ከጉሮሮ ላይ ፈሳሽ ጠርጎ መውሰድ ይችላል።
- የአርኤስቪ ኢንፌክሽንን ለመለየት የደም ምርመራዎችም ሊደረጉ ይችላሉ።

ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉህ ወይም ልጅህ አር ኤስ ቪ ይኖረዋል ብለህ የምታምን ከሆነ ለጤና አገልግሎት ሰጪህ ንገረው ። ይህ የእውነታ ወረቀት አጠቃላይ መረጃን ብቻ ነው የሚያቀርበው።

ልጅ አርኤስቪ ቢኖርበትስ?

ልጅዎ አርኤስቪ ከያዘው ወዲያውኑ ለልጅዎ ሐኪም ወይም ቅድመ-ትምህርት ቤት ማእከል ያሳውቁ።

ምን አይነት ህክምናዎች አሉ?

- ለ አርኤስቪ የተለየ መድሃኒት የለም፣ ነገር ግን ልጅዎን የበለጠ እንዲመችው ለማድረግ አንዳንድ ምልክቶችን ማከም ይችላሉ። ስለ ሕክምና አማራጮች ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር ይነጋገሩ።
- ህጻናት ልጅን ምችት እንዲሰማቸው ያድርጉ፣ እረፍት እንዲያደርጉ ይፍቀዱላቸው፣ የውሀ እጥረትን ወይም ድርቀትን ለመከላከል ብዙ ፈሳሽ መጠጣታቸውን ያረጋግጡ እና ቶሎ ቶሎ ሁኔታቸውን ይከታተሉ።
- 3 ወር ወይም ከዚያ በታች የሆኑ ጩቅላ ህጻናት 100.4°F (38°C) ወይም ከዚያ በላይ የሆነ ትኩሳት ካለባቸው በጤና እንክብካቤ አቅራቢያቸው መታየት አለባቸው።
- ስለ ልጅዎ የበሽታው ምልክቶች የሚያሳስብዎት ነገር ካለ ከልጅዎ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ ጋር ይነጋገሩ። **ልጅዎ የውሀ እጥረት ወይም የድርቀት ምልክቶች እያሳዩ ከሆነ (ጥቂት እርጥብ ዳይፐር፣ ከወትሮው ያነሰ ጥቂት ሽንት፣ ከወትሮው የበለጠ ድካም፣ መፍዘዝ፣ ደረቅ ምላስ ወይም ከንፈር፣ ሲያለቅስ ትንሽ እንባ)፣ በጣም በፈጣን እየተነፈሰ ከሆነ፣ የመተንፈስ ችግር ካጋጠመው ወይም ከባድ ራስ ምታት ካለበት ወዲያውኑ በጤና እንክብካቤ አቅራቢ መታየት አለበት።**

አርኤስቪ እንዳይሰራጭ እንዴት መርዳት እችላለሁ?

- ሲታመሙ ቤት ይቆዩ።
- በተለይም ካስነጠሱ፣ ከሳሉ ወይም አፍንጫዎን ከጠራርጉ በኋላ፤ እጅን በሰሙና እና በሞቀ ውሃ አዘውትረው ይታጠቡ።
- በሚያስለቡት ወይም በሚያስነጠሱበት ጊዜ አፍንጫዎን እና አፍዎን ይሸፍኑ።
- አይኖችዎን፣ አፍንጫዎን እና አፍዎን ከመንካት ይቆጠቡ።
- ኩባያዎችን፣ የምግብ ዕቃዎችን፣ ምግብ እና መጠጦችን አርኤስቪ ካለው ከማንኛውም ሰው ጋር ከመጋራት ይቆጠቡ።
- ህጻናት አሻንጉሊቶችን እና ሌሎች ነገሮችን በሰሙና እና በውሃ አፋቸው ውስጥ በደንብ ያጽዱ።
- የቤት ውስጥ ቦታዎችን በፀረ፡ተህዋሲያን ያጽዱ።

ልጄ ከልጆች እንክብካቤ መስጫ ተቋማቱ ቀርቶ እቤት መቆየት አለበት?

አይ እቤት መቅረት የለበትም። የመተንፈሻ አካላት ሲንስሻል ቫይረስ (RSV) በሽታ የተጋለጡ ልጆች ወይም ተመርምረው በሽታው እንደያዛቸው የወቁ ልጆች ከዚህ በታች የተጠቀሱት ነገሮች ካልሆኑ በስተቀር ወደ ሕፃናት እንክብካቤ መስጫ መሄዳቸውን ሊቀጥሉ ይችላሉ፡

- ከሌሎች የአርኤስቪ ምልክቶች ጋር የተያያዘ ትኩሳት (የሙቀት መጠኑ 100.4°F [38°C] ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ)
- በተቋማቱ ውስጥ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ላይ ለመሳተፍ በቂ የጤና ስሜት ካልተሰማው (ለምሳሌ፡ ከወትሮው የተለየ ድካም፣ የመነጨነጭ ወይም የመበሳጨት ስሜት ካለው፣ ወይም ከተለመደው በላይ እያለቀሰ ከሆነ)።

እባክዎ የልጅዎትን የእንክብካቤ ፕሮግራም የበሽታ ፖሊሲ ይከተሉ።

የመረጃ ማጣቀሻዎች/ምንጮች፡

American Academy of Pediatrics

- *Caring for our Children, Chapter 3 Health Promotion and Protection, 3.6 Management of Illness, 3.6.1 Inclusion/Exclusion Due to Illness*
- *Caring for our Children, Chapter 7 Infectious Diseases, 7.3 Respiratory Tract Infections, 7.3.8 Respiratory Syncytial Virus (RSV)*
- *Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools, 5th Edition. pages 147-148*

Centers for Diseases Control & Prevention

- *Respiratory Syncytial Virus Infection (RSV). <https://www.cdc.gov/rsv/>*

Child Care Health Program – Public Health Seattle & King County

- <https://kingcounty.gov/depts/health/child-teen-health/child-care-health/disease-prevention.aspx>