

ስትሬፕ ትሮት እና ስካርሌት ፊሽር

ውድ ወላጅ ወይም አሳዳጊ፣

ይህ የመረጃ ወረቀት እየተሰጠዎት ያለው፡-

- እርስዎ ወይም ልጅዎ ለስትሬፕ ትሮት ተጋልጠው ሊሆን ስለሚችል ነው።
- ለመረጃ አገልግሎት አላማዎች ብቻ የሚውል።

ስለ ስትሬፕ ትሮት እና ስካርሌት ፊሽር አጠቃላይ መረጃ

የስትሬፕ ትሮት እና ስካርሌት ፊሽር ምንድን ናቸው?

- የስትሬፕ ትሮት በቡድን ኤ ስትሬፕቶኮክስ ባክቴሪያ ይከሰታል።
- ስካርሌት ፊሽር የሚከሰተው ቡድን ኤ A ስትሬፕቶኮክስ ባክቴሪያ በሰውነት ውስጥ ሽፍታ የሚያመጣ መርዝ ሲያመነጭ ነው። ስትሬፕ ትሮት ያለበት ሰው ሁሉ በስካርሌት ፊሽር አይያዝም።

ሊይዙ የሚችሉት ማንን ነው?

- ማንኛውም ሰው ስትሬፕ ትሮት ሊይዘው ይችላል፣ ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ ለትምህርት በደረሱ ልጆች እና ታዳጊዎች ላይ የተለመደ ነው።
- ከ3 አመት በታች ለሆኑ ህጻናት ስትሬፕ ትሮት የተለመደ አይደለም።
- ከ3 እስከ 18 አመት እድሜ ባላቸው ህጻናት ላይ ስካርሌት ፊሽር በብዛት ይታያል።
- ስካርሌት ፊሽር ያለባቸው ልጆች በአጠቃላይ ስትሬፕ ትሮት ብቻ ካለባቸው ልጆች አንጻር አይታመሙም።

ምልክቶቹ ምንድን ናቸው?

- ስትሬፕ ትሮት
 - ትኩሳት (American Academy of Pediatrics (የአሜሪካ የህጻናት ህክምና አካዳሚ) ትኩሳትን እንደ 100.4°F [38°C] ወይም ከዚያ በላይ የሙቀት መጠን ይገልጻል)
 - የጉሮሮ ቁስል
 - የእንጥል እብጠት
 - በአንገት እና በጉሮሮ አካባቢ ያሉ የሊንፍ እጢዎች እብጠት
 - ሌሎች ምልክቶች ራስ ምታት፣ የሆድ ሀመም፣ ማቅለሽለሽ ወይም ማስታወክን ሊያካትቱ ይችላሉ።
 - ከ3 አመት በታች የሆኑ ህጻናት የጉሮሮ ቁስላት ሀመም ያልተለመደ ነው ነገር ግን የአፍንጫ ፈሳሽ እንዲሁም ከአፍ የሚወጣ መጥፎ ጠረን፣ ትኩሳት፣ ንጭንጭ ወይም ንዝንዝ እና የምግብ ፍላጎት ማጣት ሊኖራቸው ይችላል።
- ስካርሌት ፊሽር ቆዳ እንደ ብርጫቆ ወረቀት እንዲሰማው የሚያደርግ ቀይ ሽፍታ ነው።
 - ሽፍታው በውስጠኛው ክንድ፣ ብብት እና ብሽሽት አካባቢ ላይ ይበልጥ ደማቅ ቀይ ነው።
 - በአፍ ዙሪያ ያለው ቦታ የገረጣ ሊመስል ይችላል።

የቡድን A ስትሬፕቶኮክስ ባክቴሪያ እንዴት ይሰረጫል?

- ስትሬፕ ትሮት እና ስካርሌት ፊሽር የሚያመጣው ባክቴሪያ በሰጠ፣ በማስነጠስ፣ በለሃጭ (ምራቅ) እና በአፍንጫ ፈሳሽ ውስጥ ባሉ ጠብታዎች ውስጥ ይገኛል።
- ስትሬፕ ትሮት ወይም ስካርሌት ፊሽር ያለበት ሰው ሲያስል ወይም ሲያስነጥስ እና ሌላው ሰው ጠብታዎቹን ወደ ውስጥ ሲተነፍስ ሻይረሱ ሊሰራጭ ይችላል።
- በተጨማሪም እቃዎችን ወይም ኩባያዎችን የጉሮሮ ወይም ቀይ ትኩሳት ካለበት ሰው ጋር በመጋራት ሊሰራጭ ይችላል።
- ያልተለመደ ቢሆንም፣ አንድ ሰው ባክቴሪያ ያለበት ነገር ወይም ንጣፍ ነክቶ አፋን፣ አይኑን ወይም አፍንጫውን ሲነካ ባክቴሪያው ሊሰራጭ ይችላል።

- የስካርሌት ፊሽር ሽፍታው ሰውነት ለመርዝ የሚሰጠው ምላሽ ስለሆነ፣ ሽፍታው አይተላለፍም እንዲሁም በንክኪ አይተላለፍም።

ልጅ ስትሬፕ ትሮት ወይም ስካርሌት ፊሽር እንዳለበት እንዴት አውቃለሁ?

አንድ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ ስትሬፕ ትሮት እና ስካርሌት ፊሽር የሚያመጣውን ባክቴሪያ ለመመርመር ከጉሮሮ ናሙና ሊወስድ ይችላል።

ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉዎት ወይም ልጅዎ ስትሬፕ ትሮት ወይም ስካርሌት ፊሽር እንዳለበት ካሳሰብዎት የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ያነጋግሩ። ይህ የመረጃ ሉህ አጠቃላይ መረጃ ብቻ ይሰጣል።

ልጅ ስትሬፕ ትሮት ወይም ስካርሌት ፊሽር ቢኖርበትስ?

ስትሬፕ ትሮት እና ስካርሌት ፊሽር እንዴት ይታከማሉ?

- ሁለቱም በሽታዎች በጤና እንክብካቤ አቅራቢ በታዘዙ አንቲባዮቲክ መድሃኒቶች ይታከማሉ።
- ህጻናት ምችት እንዲሰማቸው ያድርጉ፣ እንዲያርፉ ይፍቀዱላቸው፣ ድርቀትን ለመከላከል ብዙ ፈሳሽ መጠጣታቸውን ያረጋግጡ እንዲሁም በተደጋጋሚ ይመልከቷቸው።
- 100.4°F (38°C) ወይም ከዚያ በላይ የሆነ ትኩሳት ያላቸው የ3 ወር ወይም ከዚያ በታች የሆኑ ጨቅላ ህጻናት በጤና እንክብካቤ አቅራቢያቸው መታየት አለባቸው።
- ስለ ልጅዎ የበሽታ ምልክቶች የሚያሳስብዎት ነገር ካለ ከልጅዎ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ ጋር ይነጋገሩ። ልጅዎ የድርቀት ምልክቶች እያሳየ ከሆነ (ትንሽ እርጥበት ያላቸው ዳይፕሮች ወይም ከወትሮው ያነሰ ሽንት፣ ከመደበኛው የበለጠ ድካም፣ ማዘር፣ ደረቅ ምላሽ ወይም ከንፈር፣ ትንሽ እንባ) ወዲያውኑ በጤና እንክብካቤ አቅራቢው መታየት አለበት።

ቡድን ኤ ስትሬፕ ትሮት እና ስካርሌት ፊሽር ለመከላከል መርዳት የምችለው እንዴት ነው?

- እጅን በሰሙና እና በሙቅ ውሃ ብዙ ጊዜ ይታጠቡ፣ በተለይም ካስነጠሱ፣ ካሳሉ ወይም አፍንጫዎን ከጠራረጉ በኋላ።
- በሚያስለቡት ወይም በሚያስነጥሱበት ጊዜ አፍንጫዎን እና አፍዎን ይሸፍኑ።
- አይኖችዎን፣ አፍንጫዎን እና አፍዎን ከመንካት ይቆጠቡ።
- ስትሬፕ ትሮት ካለበት ሰው ጋር ኩባያዎችን የመመገቢያ እቃዎችን፣ ምግብን እና መጠጦችን ከመጋራት ይቆጠቡ።
- ህጻናት ወደ አፋቸው የሚከቷቸውን አሻንጉሊቶች እና ሌሎች እቃዎች በሰሙና እና በውሃ በደንብ ያጽዱ።

ልጅ ከልጅ እንክብካቤ ቀርቶ በቤት መቆየት ይኖርበታል?

አዎ፣ ስትሬፕ ትሮት እና ስካርሌት ፊሽር ያለባቸው ልጆች ቤት ውስጥ መቆየት አለባቸው። በክፍል ተግባራት ውስጥ ለመሳተፍ በቂ ደህንነት እስኪሰማቸው ድረስ አንቲባዮቲኮችን ከጀመሩ ከ12 ሰዓታት በኋላ ወደ ልጅ እንክብካቤ ሊመለሱ ይችላሉ።

እባክዎ የልጅ እንክብካቤ ፕሮግራምዎን የበሽታ ፖሊሲ ይከተሉ።

ዋቢዎች

American Academy of Pediatrics (የአሜሪካ የህጻናት ህክምና አካዳሚ)

- Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools, 6th Edition. Pages 179-180
- Caring for our Children, Chapter 3 Health Promotion and Protection, 3.6 Management of Illness, 3.6.1 Inclusion/Exclusion Due to Illness

Centers for Disease Control & Prevention (የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማዕከል)

- Group A Streptococcal (GAS) Disease. <https://www.cdc.gov/groupastrep/diseases-public/strep-throat.html>