



Los médicos recomiendan las vacunas **Tdap, MCV y HPV** como la manera más importante de proteger a su hijo entre 11 y 18 años de contraer enfermedades graves.

- Algunas vacunas de bebé no duran toda la vida. Sus niños entre 11 y 18 años de edad necesitan vacunas adicionales para estar protegidos.
- Hay vacunas específicas creadas hechas especialmente para niños mayores y adultos porque son más propensos de contraer ciertas enfermedades. Su niño entre 11 y 18 años no recibió estas vacunas cuando era bebé.
- Ya sea que su niño esté sano o levemente enfermo, las vacunas son seguras y efectivas.

Consulte hoy al médico de su niño sobre estas vacunas.

Las vacunas son gratis para los niños entre 11 y 18 años.

Un cargo administrativo puede ser cargado, pero no se cobrará si usted no puede pagar.

Para mayor información acerca de las vacunas:

- Hable con su médico, enfermero o clínica
- Llame a Salud Pública – Seattle y el Condado de King al 206-296-4774

Es importante para su hijo tener chequeos médicos cada año.

Si necesita ayuda para encontrar un médico, enfermero o clínica, llame o visite:



¿Está protegido su niño entre 11 y 18 años contra enfermedades graves?



Pertussis

("tos ferina o convulsa")

La tos ferina es una tos que persiste durante meses y puede dificultar las funciones de comer, beber o respirar.

- La tos ferina se contagia fácilmente de persona a persona por medio de la tos y el estornudo.
- Niños mayores y adultos con frecuencia pueden contagiar bebés y mujeres embarazadas con la tos ferina y pueden morir de la misma.

La vacuna Tdap previene contra el tétanos, la difteria y la tos ferina.

- Porque la vacuna para bebés contra la tos ferina no dura, los médicos recomiendan una dosis de Tdap para todas las personas mayores de 11 años de edad.
- **Consulte al médico sobre la vacuna Tdap para usted y su hijo.**



Meningitis meningocócica

La meningitis meningocócica es una infección grave que puede provocar daño cerebral y la muerte.

- Incluso con atención médica, puede provocar la muerte en pocas horas después de los primeros síntomas.
- La enfermedad se contagia de persona a persona por medio de la tos, besos o compartir cualquier cosa a través de la boca, como botellas de agua.
- Cualquier persona puede contraer la enfermedad, pero los jóvenes adultos que tienen contacto cercano entre sí, como cuando juegan deportes en equipo o viven en dormitorios universitarios, tienen mayores probabilidades de contagiarse.

La vacuna MCV previene la enfermedad meningocócica.

- Los médicos recomiendan 2 dosis de MCV para los niños, a partir de los 11 años de edad.
- **Consulte al médico sobre la vacuna MCV para su hijo.**

Virus del papiloma humano (HPV)

El HPV es la causa principal del cáncer de útero y verrugas genitales.

- La mayoría de las personas con HPV no saben que lo tienen, pero pueden contagiar a otros a través de relaciones sexuales.
- El HPV es muy común. Al menos la mitad de todos los hombres y las mujeres se infectan durante sus vidas.

La vacuna HPV previene la infección del virus del papiloma humano y protege contra el cáncer de útero.

- La vacuna contra el HPV ofrece la mayor protección cuando se administra antes de comenzar cualquier actividad sexual.
- Los médicos recomiendan tres dosis para los niños y niñas, a partir de los 11 años de edad.
- **Consulte al médico sobre la vacuna HPV para su hijo.**

